

بیماری وبا

یک عفونت روده‌ای حاد ناشی از ویریوکلرا توکسیژنیک (تولید کننده ی سم) می‌باشد. عفونت معمولاً به شکل اولیه و به دنبال خوردن آب و غذای آلوده ایجاد می‌گردد و انتقال فرد به فرد شایع نیست.

علایم بالینی: این بیماری به صورت یک اسهال آبکی خودبخود محدود شونده می‌باشد ولی هنگامی که بیماری علامت‌دار است به درمان جایگزینی مایعات و الکترولیت‌ها نیاز است.

پیشگیری و درمان: یک نوع واکسن ضد کلرای تزریقی که در طی یک سال در دو دوز تجویز می‌شود دارای اثر بخشی حدود ۵۰ درصد، برای مدت سه ماه تا شش ماه پس از انجام واکسیناسیون می‌باشد. واکسن خوراکی ضد کلرا با اثر بخشی بهتر نسبت به فرم تزریقی نیز وجود دارد. واکسن کلرا برای بچه‌های زیر ۶ ماه توصیه نمی‌شود.

نکات مهم :

- بطور مرتب دسته‌ها را بشویید.
- تا حد امکان از پودر ORS استفاده کنید.
- برای استفاده از سبزیجات و میوه‌ها حتماً آن‌ها را ضد عفونی کنید.
- از آب اشامیدنی سالم استفاده کنید.
- داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج را طبق دستور استفاده کنید.
- تغذیه با شیر مادر برای نوزادان توصیه می‌شود.
- روش ضد عفونی کردن میوه و سبزیجات: ابتدا میوه و سبزی را با آب سالم شسته و سپس در هر لیتر آب ۳ تا ۵ قطره مایع ظرفشویی ریخته و پس از پنج دقیقه با آب سالم بشویید. سپس با نصف قاشق چایخوری پودر پرکلرین و ۵ لیتر آب به مدت ۵ دقیقه آن‌ها را ضد عفونی کرده و سپس آبکشی کنید.