

## مالاریا

مهم ترین بیماری انگلی است، از مشکلات عمدۀ بهداشتی جهان از موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است. نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر هستند.

به علت ایجاد کم خونی و عودهای مکرر باعث اتلاف نیروی کار می شود و در دفع اقتصادی اجتماعی و کشاورزی کشورها اثر می گذارد.

**علایم بالینی:** مالاریا یک بیماری حاد تب دار با دوره کمون ۷ روز یا بیشتر می باشد. بنابراین بیماری تب داری که در ظرف کمتر از ۷ روز پس از اولین تماس احتمالی ایجاد می گردد مالاریا نمی باشد از علایم بیماری می توان به تب، لرز، سردرد، درد و ضعف عضلانی، استفراغ، سرفه، اسهال و درد شکم. اشاره نمود.

راه تشخیص: اسمیر خون محیطی (آزمایش خون)

**راه انتقال:** انگل مالاریا توسط گونه های مختلف پشه آنوفل که عمدتاً بین غروب و طلوع خورشید (در زمان اوج تغذیه) به فعالیت می پردازند انتقال می یابد. خانم های حامله، بچه های کوچک و مسافرین مسن در ریسک ویژه ای قرار دارند. مالاریا در مسافرین حامله خطر مرگ مادر، زایمان زودرس، مرده زایی و مرگ نوزادی را افزایش می دهد.



پشه آنوفل گامبیه، ناقل بیماری مالاریا



محل زندگی پشه آنوفل گامبیه در آبها، نقاط گرم‌سیر

**پیشگیری:** باید برای مسافرین توضیح داده شود که حفاظت فردی در برابر گزش پشه در هنگام غروب آفتاب اولین خط دفاع در برابر مالاریا می باشد. می توان مالاریا را با استفاده دقیق حشره کش ها برای کشتن پشه ناقل، تشخیص سریع و درمان مناسب بیماران و در

صورت مؤثر و امکان پذیر بودن، تجویز پیشگیری دارویی به گروههای پر خطر محدود نمود. بنابراین :

### اقدامات پیشگیری

۱. بهسازی محیط برای کاهش محل زندگی و تکثیر پشه ها با خشکاندن آب های غیر مفید
۲. استفاده از حشره کشها
۳. محافظت از گزش توسط پشه ها با پوشیدن لباسهای آستین بلند
۴. نصب توری و پشه بند
۵. در صورت مسافرت به مناطق مالاریا خیز ، مصرف ۲۰ قرص در هفته طبق تجویز پزشک ، از یک هفته قبل تا یک هفته بعد از برگشت از این مناطق.

درمان: مراجعه به پزشک متخصص و درمان اختصاصی با استی صورت گیرد.

بخش علمی درمانگاه شبانه روزی سلامت - مشهد

[www.salamatclinic.org](http://www.salamatclinic.org)

درا  
منگاه شبانه روزی سلامت