

تب مالت

این بیماری به وسیله تماس با بافت، خون و ادرار و ترشحات حیوان آلوده و یا با خوردن شیر و فرآورده های شیری حیوانات آلوده منتقل می شود.

آلودگی از راه تنفسی، فرد به فرد، جفت حیوانات و نیز خود تلقیحی واکسن دام ها ایجاد می گردد.

علائم:

*تب (با الگوی مداوم، متناوب و یا نامنظم)	*درد مفصل
*سردرد	*کاهش وزن
*ضعف	*افسردگی
*تعریق	*درد عمومی بدن

توصیه های لازم:

⊗ اطرافیان بیمار باید از نظر مصرف فرآورده های مشابه که سبب بروز احتمالی بیماری شده است بررسی شوند.

⊗ شیر باید پاستوریزه و یا جوشانده شود.

⊗ پنیر تازه، حداقل ۲ ماه در آب نمک نگهداری و سپس مصرف شود.

⊗ افرادی که با پوست حیوانات سرو کار دارند، از پوشش محافظ دست ها و بدن استفاده کنند.

⊗ در مناطق با شیوع بالای بیماری، دام های در معرض خطر، علیه بیماری واکسینه شوند.

دکتر یزدی _ متخصص بیماری های عفونی

ریاست درمانگاه سلامت مشهد