

زخم گوارشی (زخم معده و اثنی عشر)

زخم دوازدهه یا اثنی عشر بسیار شایع تر از زخم معده است.

علت :

زخم گوارشی در نتیجه اثرات تخریبی اسید و آنزیم پیپسین و عدم توانایی سدّ دفاع مخاطی معده و یا اثنی عشر در برابر عوامل مهاجم ایجاد می شود.

مهمترین عامل، وجود میکروب هلیکو باکتر پیلوری است که در خانواده های شلوغ ، آلدگی آب آشامیدنی و تماس های فردی زیاد، بیشتر بروز می کند .

علائم :

مهمترین علامت، درد شکم است؛ ولی بیمار از درد سوزشی ، مالشی و یا احساس گرفتگی سر دل شکایت می کند .

ممکن است بیمار ترش کردن ، سوزش سردل، آروغ زدن و حالت تهوع نیز داشته باشد.

راه های پیشگیری :

از مصرف الکل و دخانیات بپرهیزید.

از مصرف قهوه و مواد کافئین دار بپرهیزید.

از مصرف آسپرین پرهیز کنید.

از نظرکنترل خون درمدفع و استفراغ دقت داشته باشد.

در صورت حالت سرگیجه و تهوع و یا درد ناگهانی شکم و درد منتشر به شانه ها به پزشک مراجعه کنید.

بخش علمی درمانگاه سلامت - مشهد

05137534050

www.salamatclinic.org