

هپاتیت آ

یک عفونت ویروسی قابل انتقال روده‌ای است. این بیماری سبب تب، ضعف و بی‌حالی، بی‌اشتهاایی، تهوع و درد شکم و سپس زردی می‌شود. از نظر طیف، مدت و شدت، بیماری از فرم خفیف یک الی دو هفتاه‌ای تا فرم شدید و ناتوان کننده چند ماهه متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه بیماری معمولاً در دوران کودکی ایجاد می‌شود که اغلب بدون علامت و خفیف است.

انتقال بیماری: ممکن است بدنیال تماس فرد به فرد یا از طریق آلودگی آب، بیخ و حلزون دریائی، آب میوه، سبزیجات و یا سایر موارد غذایی که به شکل خام مصرف می‌گردند صورت گیرد. همچنین بدنیال آلودگی مواد غذایی حین پخت و یا هنگام آماده سازی غذا منتقل می‌گردد.

پیشگیری و درمان: ایمونوگلبولین و واکسن برای تمام افراد مسافر به مناطق اندمیک و با فقر بهداشتی توصیه می‌گردد. دو نوع واکسن ویروسی غیرفعال شده وجود دارد که این واکسن‌ها برای اطفال بالای سه سال و بالغین توصیه می‌گردد. در بچه‌های زیر سه سال باید تک دوز ایمونوگلبولین قبل از مسافرت تجویز شود همچنین افراد دارای آرژی به واکسن نیز باید ایمونوگلبولین تک دوز دریافت نمایند که تا سه ماه اثر پیشگیری کننده دارد. برای اطفال و بالغین با طول مدت مسافرت بیش از سه ماه دوز ایمونوگلبولین لازم است. در صورتی که مسافرت بیش از پنج ماه تداوم دارد مسافرین می‌بایست دوز تکراری دریافت دارند.

- در کودکان در سنین مدرسه شایع است.
- استراحت کافی داشته باشد.
- مصرف غذاهای پر چرب را کاهش دهید زیرا حالت تهوع و استفراغ را تشدید می‌کند.
- روزانه یک تا دو کمپوت میوه مصرف کنید.
- بهتر است غذاهای با حجم کم استفاده کنید.
- مواد قندی مانند فرنی بیشتر استفاده کنید.
- مایعات را به میزان کافی مصرف کنید.
- پس از استفاده از دستشویی دستها را کاملاً با آب و صابون بشویید.
- وسایل شخصی از قبیل حوله و مسوک را از دسترس دیگران دور نگهدارید.
- با نظر پزشک از رفتن به مدرسه یا محل کار به مدت ۲ تا ۳ هفته بپرهیزید.
- در صورت داشتن تهوع و سرگیجه حتماً به پزشک مراجعه کنید.
- غالباً بهبودی حاصل می‌شود.
- خانواده شخص بیمار برای پیشگیری از ابتلا به بیماری باید از دارویی بنام گاماگلوبولین به صورت عضلانی تا حداقل دو هفته پس از تماس استفاده کنند.

بخش علمی درمانگاه سلامت - مشهد

www.salamatclinic.org

051-37534050